

4. Übung zur Vorlesung „Partielle Differentialgleichungen“ im SS 2016

Präsenzaufgabe 1:

Für $n \geq 2$ sei $\Gamma \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ definiert durch

$$\Gamma(z) := \begin{cases} \frac{1}{(n-2)\omega_n} |z|^{2-n}, & \text{falls } n \geq 3, \\ -\frac{1}{2\pi} \ln |z|, & \text{falls } n = 2. \end{cases}$$

Bestätige die Identitäten

$$\begin{aligned} \partial_i \Gamma(z) &= -\frac{1}{\omega_n} \cdot |z|^{-n} z_i && \text{für alle } z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad \text{und} \\ \partial_{ij} \Gamma(z) &= -\frac{1}{\omega_n} \cdot |z|^{-n-2} \cdot \left\{ |z|^2 \delta_{ij} - n z_i z_j \right\} && \text{für alle } z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \end{aligned}$$

und $\Delta \Gamma = 0$.

Präsenzaufgabe 2:

Für $x \neq y$ im \mathbb{R}^n definiere

$$k(x, y) = \frac{1 - |x|^2}{\omega_n |x - y|^n}$$

und setze

$$u(x) := \int_{|y|=1} k(x, y) dS_y, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \partial B_1.$$

Zeige, dass $\Delta_x k(x, y) = 0$ für alle y mit $|y| = 1$, dass u in $\mathbb{R}^n \setminus \partial B_1$ harmonisch ist und dass $u = 1$ auf B_1 .

Präsenzaufgabe 3:

Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet und $u \in C^2(\Omega)$ eine nichtnegative harmonische Funktion und $\bar{B}_R \subset \Omega$. Zeige anhand der Poissonschen Lösungsformel, dass dann für $x \in B_R$

$$\frac{R^{n-2}(R - |x|)}{(R + |x|)^{n-1}} u(0) \leq u(x) \leq \frac{R^{n-2}(R + |x|)}{(R - |x|)^{n-1}} u(0)$$

gilt.

Folgere, dass jede auf \mathbb{R}^n harmonische, nach unten beschränkte Funktion konstant ist.

Präsenzaufgabe 4:

Es sei $u \in C^2(\Omega)$ harmonisch. Zeige: $u \in C^\infty(\Omega)$.

Hausübungen

Abgabe: 9. Mai 2016, 9:10 Uhr

Hausaufgabe 1:

Beweise Satz 5.1 der Vorlesung: Es sei $u \in C^0(\bar{\Omega})$ so, dass für jede Kugel $B_R(x_0) \subset\subset \Omega$

$$u(x_0) = \frac{1}{|\partial B_R(x_0)|} \int_{\partial B_R(x_0)} u(y) ds_y$$

gilt. Dann ist $u \in C^2(\Omega)$ und erfüllt $-\Delta u = 0$ in Ω .

[Tipp: Sei $B = B_R(x_0) \subset\subset \Omega$. Nach 4.3 gibt es $h \in C^0(\bar{B}) \cap C^2(B)$ mit $-\Delta h = 0$ in B und $h|_{\partial B} = u|_{\partial B}$. Die Funktion $v := u - h$ hat dann eine entsprechende Mittelwerteigenschaft in jeder Kugel $B' \subset B$. Die Argumente von 2.1-2.6 zeigen nun, dass deswegen $v \equiv 0$ in B sein muss.]

Hausaufgabe 2:

Es bezeichne B die Kugel um den Ursprung im \mathbb{R}^n , $n \geq 2$, mit Radius $R > 0$. Zeige, dass für die Green'sche Funktion G erster Art in B die Identität

$$\frac{\partial}{\partial \nu_y} G(x, y) = -\frac{R^2 - |x|^2}{\omega_n R} |x - y|^{-n} \quad \text{für alle } x \in B \text{ und jedes } y \in \partial B$$

gilt.

Hausaufgabe 3:

Es seien $n \geq 1$ und $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ein beschränktes Gebiet, auf dem der Satz von Gauß gilt. Ferner seien $f \in C^0(\Omega) \cap L^1(\Omega)$ so, dass

$$\int_{\Omega} f(x) dx > 0,$$

und $u \in C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ eine Lösung der Gleichung

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega.$$

Zeige, dass es dann ein $x_0 \in \partial\Omega$ mit

$$\frac{\partial u(x_0)}{\partial \nu} < 0$$

gibt.

Hausaufgabe 4:

Es sei $B = B_1(0) \subset \mathbb{R}^2$ und $u \in C^2(B \setminus \{0\}) \cap C^0(\bar{B} \setminus \{0\})$ harmonisch mit $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{u(z)}{\log |z|} = 0$. Zeige, dass es eine harmonische Fortsetzung $v \in C^2(B)$ gibt.

Wähle als v die Lösung von

$$\begin{cases} -\Delta v = 0 & \text{in } B \\ v = u & \text{auf } \partial\Omega \end{cases}$$

und setze $w = v - u$ sowie $M := \max_{\partial\Omega} u$ und $M(r) := \max_{|x|=r} w(x)$. Zeige dann

- $|v| \leq M$ in B .
- Falls $|x| = r$ oder $|x| = 1$, so ist $-M(r) \frac{\log |x|}{\log r} \leq w(x) \leq M(r) \frac{\log |x|}{\log r}$.
- Für $x \in B \setminus B_r(0)$ ist $|w(x)| \leq M(r) \frac{\log |x|}{\log r}$.
- Für $x \in B \setminus B_r(0)$ ist $|w(x)| \leq M \frac{\log |x|}{\log r} + \frac{\log |x|}{\log r} \max_{|y|=r} u(y)$.
- $w \equiv 0$ in $B \setminus \{0\}$.